


## Différencier le frelon asiatique du frelon européen


### Frelon asiatique

*Vespa velutina*



### Frelon européen

*Vespa crabro*



### Différencier les individus

### Différencier les nids


#### Nid primaire

Au printemps, la reine fondatrice crée un nid de petite taille



#### Nid secondaire

Il peut atteindre 1 mètre de diamètre. Souvent situé en hauteur dans les arbres, il présente une forme en poire avec une petite entrée latérale



Le nid possède une large ouverture sur la partie basse, de forme cylindrique. On les trouve souvent dans les cavités ou les bâtis.



Rechercher et faire détruire les nids est le moyen de lutte le plus efficace. Attention, ne jamais essayer de détruire un nid secondaire soi-même, toujours faire appel à un professionnel. Outre le danger, une destruction mal conduite peut provoquer la fuite de fondatrices et la construction de nouveaux nids, à des emplacements inconnus

## Pourquoi lutter contre le frelon asiatique?

### Enjeux apicoles et environnementaux

Le frelon asiatique se nourrit d'insectes:

- Sa consommation d'abeilles domestiques provoque un stress au niveau des ruches et impacte les récoltes de nectar et pollen
- Biodiversité locale : un nid peut consommer en moyenne jusqu'à 11,5 kg d'insectes



### Enjeux pour la sécurité publique

La piqûre du frelon asiatique n'est pas plus dangereuse que celle du frelon européen. Cependant, une colonie peut être dangereuse avec des attaques collectives pour protéger le nid. Les personnes ou animaux à proximité peuvent alors être considérés comme une menace.

Si vous observez des frelons asiatiques ou un nid, contactez la référente frelon asiatique du département des Ardennes: [amy.clara@orange.fr](mailto:amy.clara@orange.fr)